



Prefeitura de Garanhuns
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde

QUADRAGÉSIMO QUINTO INFORME TÉCNICO

126^a, 127^a, 129^a, 133^a, 135^a, 137^a, 138^a, 139^a, 141^a, 142^a; e 4^a e 11^a da Vacina Bivalente
PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO;

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À CONTINUIDADE DA CAMPANHA

A Coordenação do Programa Nacional de Imunizações - Municipal, da Diretoria de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde de Garanhuns, atualiza as orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, iniciada a partir da decisão de autorização emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso das vacinas Sinovac/Butantan (Vacina adsorvida Covid-19 (inativada) e AstraZeneca/Fiocruz (Vacina Covid-19 recombinante), a confirmação do registro nº1.2110.0481 da vacina Pfizer (Comirnaty), concedido à Wyeth Indústria Farmacêutica e a Janssen (Johnson & Johnson - Vacina Covid-19 recombinante), com autorização temporária para uso emergencial.

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em Garanhuns em 20 de janeiro de 2021. Neste documento, atualiza-se o recebimento de doses para o alcance dos grupos alvo priorizados sequencialmente (Quadro 1) e as orientações das pautas de distribuição, frente às pactuações triparte ocorrida em audiências.



Quadro 1 - Plano Municipal de Operacionalização da vacina contra Covid-19 (PMO).

Grupos Prioritários	126 ^a	127 ^a	129 ^a	Sem n ^o	133 ^a	135 ^a
	16/03/2023	24/03/2023	04/04/2023	11/05/2023	05/05/2023	18/05/2023
Pessoas de 80 e mais	204 Doses Pfizer	168 Doses Pfizer			24 Doses Pfizer	54 Doses Pfizer
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola	-	-			-	
Pessoas 70 a 74 anos	-	-			-	
Pessoas de 65 a 69 anos	-	-			-	
Pessoas de 70 anos e mais	-	-			-	
Pessoas de 60 a 64 anos	-	-			-	
Pessoas de 60 anos e mais	-	-			-	
Pessoas de 60 anos e mais (Fator de correção para completar a população cadastrada - FCPC)	-	-			-	
Pessoas de 65 anos e mais	-	-			-	
População de 50 a 59 anos	-	-			-	
Pessoas de 50 anos e mais	-	-			-	
População de 40 a 49 anos	-	-			-	
População de 18 a 59 anos	-	-			-	
População de 18 a 59 anos (FCPC)	-	-			-	
População de 18 a 49 anos	-	-			-	
Pessoas de 18 anos e mais	204 Doses Pfizer	168 Doses Pfizer			12 Doses Pfizer	54 Doses Pfizer
Comorbidades e Pessoas com Deficiência						
Gestantes e puérperas						
População geral						
Adolescentes de 12 a 17 anos	204 Doses Pfizer	168 Doses Pfizer			30 Doses Pfizer	30 Doses Pfizer
Crianças de 05 a 11 anos	1.240 Doses Pfizer	300 Doses Pfizer				250 Doses Pfizer
Crianças de 05 a 11 anos (P. C. T. Quilombolas)						
Crianças de 06 a 11 anos						
CASE/CENIP			180 Doses Pfizer Bivalente			
Crianças de 03 e 04 anos						
Crianças de 06 meses a 4 anos	3.040 Doses Pfizer	-	-			
				600 Doses Pfizer		

Fonte: Coordenação do Programa Nacional de Imunizações Estadual

*D1 – Primeira Dose, *D2 – Segunda Dose



Grupos Prioritários	137ª	138ª	139ª	141ª	142ª
	01/06/2023	08/06/2023	14/06/2023	29/06/2023	06/07/2023
Pessoas de 80 e mais					
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola					
Pessoas 70 a 74 anos					
Pessoas de 65 a 69 anos					
Pessoas de 70 anos e mais					
Pessoas de 60 a 64 anos					
Pessoas de 60 anos e mais					
Pessoas de 60 anos e mais (Fator de correção para completar a população cadastrada - FCPC)					
Pessoas de 65 anos e mais					
População de 50 a 59 anos					
Pessoas de 50 anos e mais					
População de 40 a 49 anos					
População de 18 a 59 anos					
População de 18 a 59 anos (FCPC)					
População de 18 a 49 anos					
Pessoas de 18 anos e mais	5.004 Doses Pfizer Bivalente	150 Doses Pfizer Bivalente	1.002 Doses Pfizer Bivalente		
Comorbidades e Pessoas com Deficiência					
Gestantes e puérperas					
População geral					
Adolescentes de 12 a 17 anos	36 Doses Pfizer			30 Doses Pfizer	
Crianças de 05 a 11 anos		40 Doses Pfizer	60 Doses Pfizer		60 Doses Pfizer
Crianças de 05 a 11 anos (P. C. T. Quilombolas)					
Crianças de 06 a 11 anos					
CASE/CENIP + Funcionários					
Crianças de 03 e 04 anos					
Crianças de 06 meses a 2 anos (com comorbidades)					
Crianças de 06 meses a 4 anos					



Grupos Prioritários	4ª	11ª
	23/03/2023	18/05/2023
Pessoas de 80 e mais		
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola		
População Indígenas Contexto Urbano	24 Doses Pfizer Bivalente	
Grupos prioritários	1.488 Doses Pfizer Bivalente	5.004 Doses Pfizer Bivalente
Pessoas 70 a 74 anos		
Pessoas de 65 a 69 anos		
Pessoas de 70 anos e mais		
Pessoas de 60 a 64 anos		
Pessoas de 60 anos e mais		
Pessoas Imunossuprimidas – Idosos e Deficientes Institucionalizados, 70 anos e mais e Quilombolas		
Pessoas de 65 anos e mais		
População de 50 a 59 anos		
Pessoas de 50 anos e mais		
População de 40 a 49 anos		
População de 18 a 59 anos		
População de 18 a 59 anos (FCPC)		
População de 18 a 49 anos		
Pessoas de 18 anos e mais		
Comorbidades e Pessoas com Deficiência		
Gestantes e puérperas		
População geral		
Adolescentes de 12 a 17 anos		
Crianças de 05 a 11 anos		
Crianças de 05 a 11 anos (P. C. T. Quilombolas)		
Crianças de 06 a 11 anos		
CASE/CENIP		
Crianças de 03 e 04 anos		
Crianças de 06 meses a 2 anos (com comorbidades)		

OPERACIONALIZAÇÃO

Os riscos de agravamento e óbito pela Covid-19 e de vulnerabilidade social, orientaram a definição dos grupos prioritários delineados no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19 e no Plano Estadual e Municipal. Estes têm como objetivo promover a redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.

ATENÇÃO:

Sinovac/Butantan:

Apresentação: Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose)

AstraZeneca:

Apresentação:

Frasco ampola com 2,5 ml, multidose com 5 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

**Pfizer/Comirnaty:**

Apresentação: Frasco-ampola multidose com 6 doses (0,3ml/dose) - após a diluição, o total de doses deverá ser usado em 6 horas sob refrigeração (2°C à 8°C)

Janssen/Johnson & Johnson:

Apresentação: Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 5 doses (0,5ml/dose)
- tempo de validade após abertura do frasco de 06 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

GRUPOS PRIORITÁRIOS E MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS

No Ministério da Saúde, a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis "Eixo - Situação epidemiológica e a definição da população-alvo para vacinação" permanece acompanhando e avaliando as evoluções epidemiológicas do País; os Índices de vulnerabilidade social (IVS), calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e a tendência de ascensão na ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave, divulgados nos boletins semanais do InfoGripe ([hps://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/tree/master/Bolens%20do%20InfoGripe](https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/tree/master/Bolens%20do%20InfoGripe)), produzidos pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, para orientação de ações oportunas considerando as previsões de cronogramas de recebimento de vacinas dos diferentes contratos estabelecidos pelo MS (BRASIL, 2021).

Ressalta-se que o impacto esperado das ações de vacinação se inicia após cerca de 30 dias da distribuição da vacina, considerando os tempos operacionais bem como o tempo necessário para o desenvolvimento da resposta imune. Desta forma, não se pode considerar a vacinação como uma resposta imediata para contenção da circulação do vírus, sendo uma medida preventiva para redução da ocorrência de casos graves e óbitos, a médio e longo prazo (BRASIL, 2021).

IMPORTANTE – MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS:

Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da Covid-19 em todo território nacional, faz-se necessária a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus, tais como:

Uso de máscara;

Distanciamento social;

Etiqueta respiratória; e

Higienização das mãos, dos objetos de uso pessoal e comercializados, dentre outros.

CONCLUSÃO



No decorrer da campanha, Informes Técnicos permanecerão como meio de atualização dos cronogramas de distribuição dos lotes das vacinas recebidas pelo MS e novas orientações técnicas que se façam necessárias à continuidade da vacinação dos grupos alvo, de forma cumulativa, até que se alcance o quantitativo total da população prevista nas estimativas e atualizações do Plano Nacional de Imunização.

REFERÊNCIA

BRASIL, Ministério da Saúde. Décimo sexto Informe Técnico, Plano Operacional de Imunização. 2021.

Garanhuns, 28/12/22.